URZĄDZENIA ŁOWIECKIE SŁUŻĄCE DO DOKARMIANIA ZWIERZYNY GRUBEJ

Techniczne urządzenia łowieckie

Urządzenia do dokarmiania - wszelkiego typu paśniki, których konstrukcja jest przystosowana do dokarmiania różnych gatunków zwierzyny.

Odpowiednio skonstruowany, jest urządzeniem uniwersalnym. Składa się on z dwuspadowego dachu z umieszczonymi pod nim drabinkami do zadawania karmy objętościowej. Do drabin przytwierdza się korytka do podawania karmy treściwej lub soczystej w postaci kiszonki i okopowych.

Największym urządzeniem jest tzw. Paśnik – magazyn, który umożliwia zarówno zadawanie karmy, jak i jej przechowywanie, co ogranicza koszty częstego dowozu karmy

W tradycyjnym, dość uniwersalnym dokarmianiu obliczono pewne dawki karmy dla poszczególnych gatunków zwierzyny na okres zimowy na jednego osobnika:

Jeleń – 25 kg owsa i 60 kg siana

Daniel – 15 kg owsa i 30 kg siana

Sarna – 5 kg owsa i 12 kg siana

Dzik – 25 kg owsa i 50 kg ziemniaków.

Obecnie nie ma to jednak większego znaczenia dla praktyki łowieckiej. Odchodzimy bowiem od zasady intensywnego dokarmiania i tylko w skrajnie niekorzystnych warunkach zimowych staje się ono konieczne dla ograniczenia śmiertelności naturalnej. W niektórych łowiskach, w których znaczący skład drzewostanu stanowi dąb, w jego latach nasiennych dokarmianie staje się całkowicie zbędne

Słownik:

paśnik – urządzenie do podawania karmy zwierzynie

Karmowisko – miejsce wykładania karmy dla zwierzyny płowej i dzików

Poletko -powierzchnia uprawna z roślinami służącymi zwierzynie bezpośrednio jako żer i osłona, lub pośrednio, dla produkcji karmy zadawanej w okresie dokarmiania

DOKARMIANIE

PRZECHOWYWANIE

Paśnik drabinowy

Paśnik samoczynny

Paśnik-magazyn

Paśnik dla dzików

Lizawki

Silosy

Brogi

Paśnik - magazyn

Paśnik drabinowy

- urządzenie uniwersalne
- składa się z dwuspadowego dachu z umieszczonymi pod nim drabinami do zadawania karmy objętościowej
- do drabin przytwierdzone są korytka do podawania karmy treściwej lub soczystej


450 cm
400 cm
180 cm
20 cm
40 cm
400 cm
150 cm
350 cm

Paśnik samoczynny

- stosunkowo ciężki dach jest osadzony na dwóch prowadnicach
-regulacja położenia dachu umożliwia jednorazowe zadawanie nawet znacznej ilości karmy przy równoczesnym silnym jej sprasowaniu
-na czole paśnika umieszczone są pojemniki na karmę treściwą-uzupełniane samoczynnie w miarę wyjadania karmy
- Korytka po bokach do wykładania kiszonki

Paśnik - magazyn

- umożliwia zadawanie i przechowywanie karmy
- ogranicza koszty częstego dowozu karmy oraz zmniejsza problemy dowozu karmy podczas zalegania grubej pokrywy śnieżnej
- mogą powodować nadmierną koncentrację zwierzyny, gdyż nie mogą być zbyt licznie rozmieszczone w łowisku

Paśnik dla dzików

- podobne w konstrukcji do podsypów dla bażantów
- jednostronnie skośny, opadający dach umożliwia korzystanie z karmy przez wszystkie osobniki z watahy
- utrudnia dostęp do karmy dużym dzikom, ale umożliwia korzystanie z niej warchlakom
-wyłożona karma jest niedostępna dla jeleniowatych, co jest ważne przy dużych mrozach, które powodują silne przemarzanie okopowych , a te w takiej postaci źle wpływają na przewód pokarmowy jeleniowatych



Lizawki

- stosowane wokół punktów dokarmiania zwierzyny
- używane do podawania jeleniowatym brył soli lub soli zmieszanej z gliną
- uzupełniają niedobór soli mineralnych, potrzebnych organizmowi zwierzęcemu szczególnie w okresie wczesnego przedwiośnia i wiosny

Lizawki

- skrzynkowe
- słupowe z wydrążonym otworem
- słupkowe ze skrzynką

Silosy

- służą do przechowywania przygotowanej kiszonki
- najlepiej zlecić ich budowę w pobliżu punktów dokarmiania
- silos składa się z trzech kręgów betonowych o średnicy 100-150 cm, które umieszcza się na dnie desek przykrytych papierem silosowym i wkopanym na odpowiednią głębokość , tak by ostatni krąg wystawał ok. 30 cm nad powierzchnię ziemi
- wierzch przykrywa się papierem silosowym i drewnianą pokrywą, 20-30 cm warstwą słomy i przysypuje ziemią (30-50cm)
- okres zakiszania trwa ok. 2 miesięcy

Brogi

- służą do magazynowania paszy objętościowej



Urządzenia służące do dokarmiania zwierzyny :

- nie powinny być usytuowane w zaroślach lub gęstych młodnikach, ani w dołkach
- zwierzyna musi widzieć co się wokół dzieje, miejsce musi być spokojne, aby zwierzyna czuła się tam bezpiecznie
- miejsce dokarmiania jeleni powinno być umieszczone w starodrzewiu, na górce i niezbyt daleko od miejsca w którym zwierzęta mogłyby się ukryć w razie niebezpieczeństwa
- dla danieli i saren dokarmianie powinno być zorganizowane w drągowinach, zachowując analogiczne warunki jak w przypadku jeleni
- miejsca dokarmiania nie powinny znajdować się w okolicach ruchliwych dróg i szlaków turystycznych

- liczba lizawek uzależniona jest od liczby i zagęszczenia zwierzyny. Przy dużym zagęszczeniu trzeba ustawić lizawki na każde 10 szt. Zwierzyny
- wskazane jest tworzenie kompleksów paśników, aby mogły z nich korzystać np. wszystkie osobniki chmary , rudla lub watachy

Dziękuję

Darz Bór!